

OBJECTIFS

- Connaître la notion de fonction dérivée.
- Connaître les formules pour dériver les fonctions puissances ainsi que les sommes et les produits de fonctions puissances par un nombre.
- Savoir calculer la dérivée d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à trois.
- Connaître le lien entre la dérivée d'une fonction et son sens de variation.
- Déterminer le sens de variation et les extremums d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 3.

I Dérivée d'une fonction

1. Nombre dérivé, fonction dérivée

À RETENIR

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- Soit $a \in I$. On dit que f est **dérivable** en a si le nombre $f'(a)$ existe.
- On dit que f est **dérivable** sur I si $f'(a)$ existe quelque soit $a \in I$.

Dans ce dernier cas, on appelle f' la fonction qui à tout $x \in I$ associe le nombre dérivé $f'(x)$: c'est la **fonction dérivée** (ou plus simplement **dérivée**) de f .

INFORMATION

Remarque

Si f est une fonction dérivable en $a \in \mathbb{R}$, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente en a (lorsqu'elle existe). C'est par conséquent la "limite" du taux de variation $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ lorsque b "tend" vers a .

En faisant le changement de variable $b = a + h$, on obtient que $f'(a)$ est la "limite" du taux de variation $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ lorsque h "tend" vers 0.

EXERCICE 1

Soit f la fonction constante égale à 3. Soit $h \in \mathbb{R}$.

- Calculer $\frac{f(0+h)-f(0)}{h}$.
 - Pour $h = 1$:
 - Pour $h = 0,1$:
 - Pour $h = 0,01$:
- Conjecturer la valeur de $f'(0)$
- Conjecturer la valeur de $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/fonction-derivee/#correction-1>.



2. Dérivées usuelles

À RETENIR

Propriété

Soit $n \in \mathbb{N}$. Alors, $x \mapsto x^n$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $x \mapsto nx^{n-1}$. En particulier, on a les formules suivantes.

Fonction	Dérivée
$x \mapsto 1$	$x \mapsto 0$
$x \mapsto x$	$x \mapsto 1$
$x \mapsto x^2$	$x \mapsto 2x$
$x \mapsto x^3$	$x \mapsto 3x^2$

EXERCICE 2

Calculer la dérivée des fonctions suivantes.

1. $x \mapsto x^4$: 2. $x \mapsto x^7$: 3. $x \mapsto x^{101}$:

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/fonction-derivee/#correction-2>.

3. Opérations sur les dérivées

À RETENIR

Propriété

- Toutes les fonctions polynômiales sont définies et dérivables sur $\mathbb{R}$.
- Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un même intervalle I . Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

Fonction	Dérivée
$u + v$	$u' + v'$
λu	$\lambda u'$

EXERCICE 3

Calculer la dérivée des fonctions suivantes.

1. $f : x \mapsto x^3 + x$:
.....
2. $g : x \mapsto 7x^2$:
.....
3. $h : x \mapsto \frac{2}{3}x^3 - 4x$:
.....
4. $i : x \mapsto 4x^3 - x^2 + 3x - 5$:
.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/fonction-derivee/#correction-3>.

1. Lien entre dérivée et variations d'une fonction

À RETENIR ∞

Théorème

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . On a les relations suivantes.

Signe de la dérivée	Variation de la fonction
$f'(x) > 0$	f est strictement croissante
$f'(x) \geq 0$	f est croissante
$f'(x) < 0$	f est strictement décroissante
$f'(x) \leq 0$	f est décroissante
$f'(x) = 0$	f est constante

EXEMPLE 💡

La fonction f du premier exercice est constante et de dérivée nulle.

EXERCICE 4 📄

On considère la fonction $f : x \mapsto x^3 + 4,5x^2 - 12x + 0,5$, définie et dérivable sur $[-5; 4]$.

1. Montrer que $f'(x) = 3(x - 1)(x + 4)$ pour tout $x \in [-5; 4]$.

2. Étudier les variations de f sur $[-5; 4]$.



2. Extrema

À RETENIR

Propriété

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I . Soit $c \in I$. Si $f'(c) = 0$ et si f' change de signe de part et d'autre de c , alors $f(c)$ est un extremum (local) de f . On a deux situation possibles :

Valeur de x	c
Signe de $f'(x)$	$- \quad 0 \quad +$
Variations de f	$\nearrow \quad f(c) \quad \searrow$

Valeur de x	c
Signe de $f'(x)$	$+ \quad 0 \quad -$
Variations de f	$\searrow \quad f(c) \quad \nearrow$

EXERCICE 5

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{3}x^3 - 16x$, définie et dérivable sur $[-6;6]$.

1. Étudier les variations de f sur $[-6;6]$.

2. En déduire les extrema de f sur $[-6;6]$

.....

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/fonction-derivee/#correction-5>.

